

Como  $\alpha v \in S$ ,  $\alpha w \in L(S)$  e  $L(S)$  é fechado sob a multiplicação por escalar. Se  $w_1, w_2 \in L(S)$ , existem  $v_1, v_2 \in S$  tais que  $L(v_1) = w_1$  e  $L(v_2) = w_2$ . Logo,

$$w_1 + w_2 = L(v_1) + L(v_2) = L(v_1 + v_2)$$

$L(S)$  é fechado sob a soma. □

**EXEMPLO 11.** Seja  $L$  a transformação linear de  $R^2$  em  $R^2$  definida por

$$L(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Um vetor  $x$  pertence ao núcleo de  $L$  se e somente se  $x_1 = 0$ . Logo,  $\ker(L)$  é o subespaço unidimensional de  $R^2$  gerado por  $e_2$ . Um vetor  $y$  pertence à imagem de  $L$  se e somente se  $y$  é um múltiplo de  $e_1$ . Logo,  $L(R^2)$  é o subespaço unidimensional de  $R^2$  gerado por  $e_1$ . □

**EXEMPLO 12.** Seja  $L : R^3 \rightarrow R^2$  a transformação linear definida por

$$L(x) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3)^T$$

e seja  $S$  o subespaço de  $R^3$  gerado por  $e_1$  e  $e_3$ .

Se  $x \in \ker(L)$ , então

$$x_1 + x_2 = 0 \quad \text{e} \quad x_2 + x_3 = 0$$

Fazendo a variável livre  $x_3 = a$ , obtemos

$$x_2 = -a, \quad x_1 = a$$

e, portanto,  $\ker(L)$  é o subespaço unidimensional de  $R^3$  de todos os vetores da forma  $a(1, -1, 1)^T$ .

Se  $x \in S$ , então  $x$  tem que ser da forma  $(a, 0, b)^T$ , logo  $L(x) = (a, b)^T$ . É claro que  $L(S) = R^2$ . Como a imagem do subespaço  $S$  é o  $R^2$  inteiro, a imagem de  $L$  tem que ser todo o  $R^2$  [isto é,  $L(R^3) = R^2$ ]. □

**EXEMPLO 13.** Seja  $D : P_3 \rightarrow P_3$  o operador derivada, dado por

$$D(p(x)) = p'(x)$$

O núcleo de  $D$  consiste em todos os polinômios de grau 0. Logo,  $\ker(D) = P_1$ . Como a derivada de qualquer polinômio em  $P_3$  é um polinômio em  $P_2$ , temos que  $D(P_3) = P_2$ . □

### EXERCÍCIOS

1. Mostre que cada uma das aplicações seguintes é uma transformação linear de  $R^2$  em  $R^2$ . Descreva geometricamente o que cada uma delas faz.

- (a)  $L(x) = (-x_1, x_2)^T$
- (b)  $L(x) = -x$
- (c)  $L(x) = (x_2, x_1)^T$
- (d)  $L(x) = \frac{1}{2}x$
- (e)  $L(x) = x_2 e_2$

2. Seja  $L$  a transformação linear de  $R^2$  em si mesmo definida por

$$L(x) = (x_1 \cos \alpha - x_2 \sin \alpha, x_1 \sin \alpha + x_2 \cos \alpha)^T$$

Expresse  $x_1, x_2$  e  $L(x)$  em coordenadas polares. Descreva geometricamente o efeito dessa transformação linear.

3. Seja  $a$  um vetor fixo não-nulo em  $R^2$ . Uma aplicação da forma

$$L(x) = x + a$$

é chamada de *translação*. Mostre que uma translação não é uma transformação linear. Ilustre geometricamente o efeito de uma translação.

4. Determine se as transformações de  $R^3$  em  $R^2$  a seguir são ou não lineares.

- (a)  $L(\mathbf{x}) = (x_2, x_3)^T$  (b)  $L(\mathbf{x}) = (0, 0)^T$   
 (c)  $L(\mathbf{x}) = (1 + x_1, x_2)^T$  (d)  $L(\mathbf{x}) = (x_3, x_1 + x_2)^T$
5. Determine se as transformações de  $R^2$  em  $R^3$  a seguir são ou não lineares.  
 (a)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, 1)^T$  (b)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, x_1 + 2x_2)^T$   
 (c)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, 0, 0)^T$  (d)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2)^T$
6. Determine se as transformações de  $R^{m \times n}$  em  $R^{n \times n}$  a seguir são ou não lineares.  
 (a)  $L(A) = 2A$  (b)  $L(A) = A^T$   
 (c)  $L(A) = A + I$  (d)  $L(A) = A - A^T$
7. Determine se as transformações de  $P_2$  em  $P_3$  a seguir são ou não lineares.  
 (a)  $L(p(x)) = xp(x)$   
 (b)  $L(p(x)) = x^2 + p(x)$   
 (c)  $L(p(x)) = p(x) + xp(x) + x^2p'(x)$
8. Para cada  $f \in C[0, 1]$ , defina  $L(f) = F$ , onde

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \quad 0 \leq x \leq 1$$

9. Mostre que  $L$  é uma transformação linear de  $C[0, 1]$  em  $C[0, 1]$ . Depois, encontre  $L(e^x)$  e  $L(x^2)$ .  
 Determine se as transformações de  $C[0, 1]$  em  $R^1$  a seguir são ou não lineares.  
 (a)  $L(f) = f(0)$  (b)  $L(f) = |f(0)|$   
 (c)  $L(f) = [f(0) + f(1)]/2$  (d)  $L(f) = \left\{ \int_0^1 [f(x)]^2 dx \right\}^{1/2}$

10. Se  $L$  é uma transformação linear de  $V$  em  $W$ , use indução matemática para provar que

$$\begin{aligned} L(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n) \\ = \alpha_1 L(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 L(\mathbf{v}_2) + \cdots + \alpha_n L(\mathbf{v}_n) \end{aligned}$$

11. Seja  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  uma base para um espaço vetorial  $V$  e sejam  $L_1$  e  $L_2$  duas transformações lineares de  $V$  em um espaço vetorial  $W$ . Mostre que, se

$$L_1(\mathbf{v}_i) = L_2(\mathbf{v}_i)$$

para cada  $i = 1, \dots, n$ , então  $L_1 = L_2$  [isto é, mostre que  $L_1(\mathbf{v}) = L_2(\mathbf{v})$  para todo  $\mathbf{v} \in V$ ].

12. Seja  $L$  uma transformação linear de  $R^1$  em  $R^1$  e seja  $a = L(1)$ . Mostre que  $L(x) = ax$  para todo  $x \in R^1$ .  
 13. Seja  $L$  um operador linear de um espaço vetorial  $V$  nele mesmo. Defina, por recursão, o operador  $L^n$ ,  $n \geq 1$  da seguinte maneira:

$$L^1 = L$$

$$L^{k+1}(\mathbf{v}) = L(L^k(\mathbf{v})) \quad \text{para todo } \mathbf{v} \in V$$

Mostre que  $L^n$  é um operador linear para todo  $n \geq 1$ .

14. Sejam  $L_1: U \rightarrow V$  e  $L_2: V \rightarrow W$  transformações lineares e seja  $L = L_2 \circ L_1$  a transformação definida por

$$L(\mathbf{u}) = L_2(L_1(\mathbf{u}))$$

para  $\mathbf{u} \in U$ . Mostre que  $L$  é uma transformação linear de  $U$  em  $W$ .

15. Determine o núcleo e a imagem de cada uma das transformações lineares de  $R^3$  em  $R^3$ .  
 (a)  $L(\mathbf{x}) = (x_3, x_2, x_1)^T$   
 (b)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, 0)^T$   
 (c)  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_1, x_1)^T$
16. Seja  $S$  o subespaço de  $R^3$  gerado por  $\mathbf{e}_1$  e  $\mathbf{e}_2$ . Para cada um dos operadores lineares no Exercício 15, determine  $L(S)$ .
17. Determine o núcleo e a imagem de cada uma das transformações lineares de  $P_3$  em  $P_3$  dadas a seguir.  
 (a)  $L(p(x)) = xp'(x)$