

LISTA 2: Supremo e ínfimo

Exercício 1 Seja E um subconjunto de um conjunto ordenado S . Suponha que $\alpha \in S$ é uma cota inferior de E e que $\beta \in S$ é uma cota superior de E . Mostre que $\alpha \leq \beta$.

Exercício 2 Considere $A \subset \mathbb{R}$ um subconjunto não vazio e limitado inferiormente e defina

$$-A \doteq \{-x; x \in A\}.$$

Prove que $\inf A = -\sup(-A)$.

Exercício 3 Considere dois números complexos

$$z = a + bi \quad e \quad w = c + di$$

e defina a relação

$$z < w \doteq \text{se } a < c, \text{ ou } a = c \text{ e } b < d.$$

Verifique que $<$ define uma relação de ordem em \mathbb{C} . Esta relação de ordem é compatível com as operações de soma e produto usuais de \mathbb{C} ? (Dica: o complexo $z = i$ é um problema.)

Exercício 4 Resolva as seguintes equações (em \mathbb{R}) justificando cada operação que você utilizar

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (a) $2x + 5 = 8;$ | (c) $x^2 = 2x;$ |
| (b) $x^2 - 1 = 3;$ | (d) $(x + 2)(x - 1) = 0;$ |

Exercício 5 Se $a \in \mathbb{R}$ satisfaz $a^2 = a$, prove que $a = 1$ ou $a = 0$;

Exercício 6 Dados $a, b \in \mathbb{R}$, mostre que $a^2 + b^2 = 0$ se, e somente se, $a = b = 0$;

Exercício 7 Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $0 < a < b$. Prove que $a^n < b^n$, para qualquer $n \in \mathbb{N}$;

Exercício 8 Obtenha o ínfimo e o supremo, caso existam, de cada um dos conjuntos.

- | | |
|---|---|
| (a) $A = \{x \in \mathbb{R}; 2x + 5 > 0\};$ | (c) $C = \{x \in \mathbb{R}; x < 1/x\};$ |
| (b) $B = \{x \in \mathbb{R}; x + 2 \geq x^2\};$ | (d) $D = \{x \in \mathbb{R}; x^2 - 2x - 5 < 0\};$ |

Exercício 9 Mostre que se $A \subset \mathbb{R}$ contém uma de suas cotas superiores, então esta cota superior é o supremo de A ;

Exercício 10 Seja $A \subset \mathbb{R}$ não vazio. Mostre que $\beta \in \mathbb{R}$ é uma cota superior de A se, e somente se, as condições

$$t \in \mathbb{R} \quad e \quad t > \beta$$

implicam em $t \notin A$;

Exercício 11 Sejam A e B subconjuntos limitados de \mathbb{R} .

- (a) Mostre que $A \cup B$ é limitado;
- (b) Mostre que $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup(A), \sup(B)\}$;

Exercício 12 Sejam A um subconjunto limitado de \mathbb{R} e $A_0 \subset A$, não vazio. Mostre que

$$\inf(A) \leq \inf(A_0) \leq \sup(A_0) \leq \sup(A)$$

Exercício 13 Sejam A e B subconjuntos limitados e não vazios de \mathbb{R} e defina

$$A + B \doteq \{a + b, \forall a \in A \text{ e } b \in B\}$$

- (a) Mostre que $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$;
- (b) Mostre que $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$;

Exercício 14 Sejam A e B subconjuntos limitados e não vazios de \mathbb{R} e defina

$$A \cdot B \doteq \{a \cdot b, \forall a \in A \text{ e } b \in B\}$$

- (a) Se $A, B \subset \mathbb{R}^+$, mostre que $\sup(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \sup(B)$;
- (b) Se $A, B \subset \mathbb{R}^-$, mostre que $\sup(A \cdot B) = \inf(A) \cdot \inf(B)$;
- (c) Se $A \subset \mathbb{R}^+$ e $B \subset \mathbb{R}^-$, mostre que $\inf(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \inf(B)$;

Exercício 15 Sejam X um conjunto não vazio e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função com $Im(f)$ um conjunto limitado. Dado $a \in \mathbb{R}$ mostre que

$$\begin{aligned}\sup\{a + f(x); x \in X\} &= a + \sup\{f(x); x \in X\} \\ \inf\{a + f(x); x \in X\} &= a + \inf\{f(x); x \in X\}\end{aligned}$$

Exercício 16 Sejam X um conjunto não vazio e $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções com $Im(f)$ e $Im(g)$ limitados. Mostre que

$$\begin{aligned}\sup\{f(x) + g(x); x \in X\} &\leq \sup\{f(x); x \in X\} + \sup\{g(x); x \in X\} \\ \inf\{f(x) + g(x); x \in X\} &\geq \inf\{f(x); x \in X\} + \inf\{g(x); x \in X\}\end{aligned}$$

Exercício 17 Considere os conjuntos $X = Y = \{x \in \mathbb{R}; 0 < x < 1\}$ e defina a função $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ por $h(x, y) = 2x + y$.

- (a) Fixado $x \in X$, obtenha os valores

$$f(x) \doteq \sup\{h(x, y); y \in Y\};$$

- (b) Obtenha $\inf\{f(x); x \in X\}$;

- (c) Fixado $y \in Y$, obtenha os valores

$$g(y) \doteq \inf\{h(x, y); x \in X\};$$

- (d) Obtenha $\sup\{g(y); y \in Y\}$;

Exercício 18 Repita o exercício anterior para a função $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$h(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < y, \\ 1, & \text{se } x \geq y \end{cases}$$

Exercício 19 Sejam X e Y conjuntos não vazios e $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. Defina as funções $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f(x) \doteq \sup\{h(x, y); y \in Y\} \quad e \quad g(y) \doteq \inf\{h(x, y); x \in X\}$$

Prove que

$$\sup\{g(y); y \in Y\} \leq \inf\{f(x); x \in X\}$$