

# ÁLGEBRA LINEAR

CM 005 - Eng. Industrial Madereira

Professor:

**Fernando de Ávila Silva**

Departamento de Matemática - UFPR

## LISTA: Autovalores e Autovetores

Esta lista está baseada nos exercícios do livro *Álgebra Linear com Aplicações* de Steven J. Leon.

---

Resolva os exercícios:

(1) (Páginas: 217, 218,219) 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 25

mais  $(a_{11} - \lambda)$  e  $(a_{ii} - \lambda)$ . Expan-

mais de  $n - 2$  elementos diagonais do termo de maior grau de

$\dots (\lambda - \lambda_n)$   
 $-\lambda)$

minarmos o mesmo coeficiente

dada por  $\text{tr}(A)$ .

$i - 1 = 4$

ve que

□

$n$  maior, é muito mais difícil métodos numéricos para calcular. Se os autovalores de  $A$  precisão comparando a soma

res de matrizes semelhantes. Se uma matriz invertível  $S$  tal

**Teorema 6.1.1.** *Sejam  $A$  e  $B$  matrizes  $n \times n$ . Se  $B$  é semelhante a  $A$ , então as duas matrizes têm o mesmo polinômio característico e, portanto, os mesmos autovalores.*

*Demonstração.* Vamos denotar por  $p_A(x)$  e  $p_B(x)$  os polinômios característicos de  $A$  e  $B$ , respectivamente. Se  $B$  é semelhante a  $A$ , existe uma matriz invertível  $S$  tal que  $B = S^{-1}AS$ . Temos, então,

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) \\ &= \det(S^{-1}AS - \lambda I) \\ &= \det(S^{-1}(A - \lambda I)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(S) \\ &= p_A(\lambda) \end{aligned}$$

Os autovalores da matriz são as raízes do polinômio característico. Como as duas matrizes têm o mesmo polinômio característico, elas têm que ter os mesmos autovalores. □

**EXEMPLO 6.** Sejam

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad S = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

É fácil ver que os autovalores de  $T$  são  $\lambda_1 = 2$  e  $\lambda_2 = 3$ . Definindo  $A = S^{-1}TS$ , os autovalores de  $A$  devem ser iguais aos de  $T$ .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

Deixamos a cargo do leitor a verificação de que os autovalores dessa matriz são  $\lambda_1 = 2$  e  $\lambda_2 = 3$ . □

**EXERCÍCIOS**

1. Encontre os autovalores e os auto-espacos correspondentes de cada uma das matrizes a seguir.

- |  |  |
|--|--|
| (a) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$   | (b) $\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$   |
| (c) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  | (d) $\begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$  |
| (e) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$  | (f) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$                              |
| (g) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$                              | (h) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$                             |
| (i) $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$                           | (j) $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$                           |
| (k) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ | (l) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ |

- 2. Mostre que os autovalores de uma matriz triangular são os elementos diagonais da matriz.
- 3. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$ . Mostre que  $A$  é singular se e somente se  $\lambda = 0$  é um autovalor de  $A$ .
- 4. Seja  $A$  uma matriz invertível e seja  $\lambda$  um autovalor de  $A$ . Mostre que  $1/\lambda$  é um autovalor de  $A^{-1}$ .
- 5. Seja  $\lambda$  um autovalor de  $A$  e seja  $\mathbf{x}$  um autovetor associado. Use indução matemática para mostrar que  $\lambda^m$  é um autovalor de  $A^m$  e que  $\mathbf{x}$  é um autovetor de  $A^m$  associado a  $\lambda^m$  para  $m = 1, 2, \dots$ .
- 6. Uma matriz  $A$   $n \times n$  é dita idempotente se  $A^2 = A$ . Mostre que, se  $\lambda$  é um autovalor de  $A$  e  $\mathbf{x}$  é um autovetor associado a  $\lambda$ , então  $\lambda$  tem que ser igual a 0 ou a 1.
- 7. Uma matriz  $A$   $n \times n$  é dita nilpotente se  $A^k = O$  para algum inteiro positivo  $k$ . Mostre que todos os autovalores de uma matriz nilpotente são nulos.
- 8. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$  e seja  $B = A - \alpha I$ , onde  $\alpha$  é um escalar. Qual a relação entre os autovalores de  $A$  e de  $B$ ? Explique.
- 9. Mostre que  $A$  e  $A^T$  têm os mesmos autovalores. Elas têm necessariamente os mesmos autovetores? Explique.
- 10. Mostre que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

vai ter autovalores complexos se  $\theta$  não for um múltiplo de  $\pi$ . Interprete esse resultado geometricamente.

- 11. Seja  $A$  uma matriz  $2 \times 2$ . Se  $\text{tr}(A) = 8$  e  $\det(A) = 12$ , quais são os autovalores de  $A$ ?
- 12. Seja  $A = (a_{ij})$  uma matriz  $n \times n$  com autovalores  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . Mostre que

$$\lambda_j = a_{jj} + \sum_{i \neq j} (a_{ii} - \lambda_i) \quad \text{para } j = 1, \dots, n$$

- 13. Seja  $A$  uma matriz  $2 \times 2$  e seja  $p(\lambda) = \lambda^2 + b\lambda + c$  o polinômio característico de  $A$ . Mostre que  $b = -\text{tr}(A)$  e que  $c = \det(A)$ .
- 14. Seja  $\lambda$  um autovalor não-nulo de  $A$  e seja  $\mathbf{x}$  um autovetor associado. Mostre que  $A^m \mathbf{x}$  também é um autovetor associado a  $\lambda$  para  $m = 1, 2, \dots$ .
- 15. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$  e seja  $\lambda$  um autovalor de  $A$ . Se  $A - \lambda I$  tem posto  $k$ , qual é a dimensão do auto-espaço associado a  $\lambda$ ? Explique.
- 16. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$ . Mostre que um vetor  $\mathbf{x}$  em  $R^n$  é um autovetor de  $A$  se e somente se  $\mathbf{x}$  pertence a um subespaço  $S$  de  $R^n$  gerado por  $\mathbf{x}$  e  $A\mathbf{x}$  tem dimensão 1.
- 17. Sejam  $\alpha = a + bi$  e  $\beta = c + di$  escalares complexos e sejam  $A$  e  $B$  matrizes com coeficientes reais.
  - (a) Mostre que

$$\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta} \quad \text{e} \quad \overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta}$$

- (b) Mostre que os elementos  $(i, j)$  de  $\overline{AB}$  e de  $\overline{A} \overline{B}$  são iguais e, portanto, que

$$\overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$$

- 18. Sejam  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r$  autovetores de uma matriz  $A$   $n \times n$  e seja  $S$  o subespaço de  $R^n$  gerado por  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r$ . Mostre que  $S$  é invariante sob  $A$  (isto é, mostre que  $A\mathbf{x} \in S$  sempre que  $\mathbf{x} \in S$ ).
- 19. Seja  $B = S^{-1}AS$  e seja  $\mathbf{x}$  um autovetor de  $B$  associado a um autovalor  $\lambda$ . Mostre que  $S\mathbf{x}$  é um autovetor de  $A$  associado a  $\lambda$ .
- 20. Mostre que, se duas matrizes  $A$  e  $B$  têm um autovetor em  $\mathbf{x}$  em comum (mas não necessariamente o mesmo autovalor em comum), então  $\mathbf{x}$  é também um autovetor de qualquer matriz da forma  $C = \alpha A + \beta B$ .
- 21. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$  e seja  $\lambda$  um autovalor de  $A$ . Mostre que, se  $\mathbf{x}$  é um autovetor associado a  $\lambda$ , então  $\mathbf{x}$  pertence ao espaço coluna de  $A$ .
- 22. Seja  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  uma base ortonormal para  $R^n$  e sejam  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  escalares. Defina

$$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n \mathbf{u}_n^T$$

Mostre que  $A$  é uma matriz simétrica com autovalores  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  e que  $\mathbf{u}_i$  é um autovetor associado a  $\lambda_i$  para cada  $i$ .

- 23. Seja  $A$  uma matriz triangular superior. Mostre que  $\delta$  é um autovalor de  $A$  se e somente se  $\delta$  é um elemento da diagonal principal de  $A$ .
- 24. Sejam  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$  autovalores de  $A$  e  $\mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}_2$  autovetores de  $A^T$  associados a  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$ , respectivamente. Mostre que  $\mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}_2$  são ortogonais se  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ .
- 25. Sejam  $A$  e  $B$  matrizes  $n \times n$ .
  - (a) Se  $\lambda$  é um autovalor de  $A$ , mostre que  $\lambda$  é também um autovalor de  $B$ .
  - (b) Se  $\lambda = 0$  é um autovalor de  $A$ , mostre que  $\lambda = 0$  é também um autovalor de  $B$ .
- 26. Prove que não existe uma matriz invertível  $A$  tal que  $A^2 = -A$ .
- 27. Seja  $p(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0)$  o polinômio característico de uma matriz  $A$   $n \times n$ . Mostre que  $p(A) = O$ .

- (a) Mostre que, se  $\lambda$  é um autovalor de  $A$  e  $\mathbf{x}$  é um autovetor associado a  $\lambda$ , então  $\mathbf{x}$  é um autovetor de  $A^m$  associado a  $\lambda^m$ .
- (b) Use o item (a) para mostrar que o polinômio característico de  $A^m$  é  $p(\lambda^m)$ .

A matriz  $C$  é chamada

- 28. O resultado dado no item 27 é conhecido como o teorema de Cayley-Hamilton. Prove isso da seguinte maneira:
  - (a) Seja

e use indução matemática para mostrar que

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n (\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0)$$

- (b) Mostre que

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n (\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0)$$

## SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Autovalores têm um papel importante na resolução de sistemas de equações lineares com coeficientes constantes. Vamos começar

