

Professor:
Fernando de Ávila Silva
 Departamento de Matemática - UFPR

1. Converta de graus para radianos:

- (a) 30° (b) 10° (c) 45° (d) 135° (e) 170°
 (f) 270° (g) 15° (h) 700° (i) 1080° (j) 36°

2. Converta de radianos para graus:

- (a) $\frac{5\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) 3π (d) $\frac{\pi}{36}$ (e) 10π (f) $\frac{3\pi}{2}$


3. Considere um triângulo com lados a , b e c , onde os ângulos opostos a estes lados são \widehat{A} , \widehat{B} e \widehat{C} , respectivamente.

Prove a *lei dos senos* onde:

$$\frac{\sin \widehat{A}}{a} = \frac{\sin \widehat{B}}{b} = \frac{\sin \widehat{C}}{c}.$$

(Dica: Calcule a área deste triângulo considerando cada um dos lados como a base. Estas serão todas iguais.)

4. Considere um triângulo ABC , com lados a , b e c e ângulo θ como mostra a figura.



Com base nele, prove a *lei dos cossenos*:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta,$$

(Dica: use o Teorema de Pitágoras.)

5. Deduza fórmulas em termos de $\sin \theta$ e $\cos \theta$ de:

- (a) $\sin 3\theta$ (b) $\cos 3\theta$ (c) $\cos 4\theta$ (d) $\sin 4\theta$

6. Prove as seguintes identidades trigonométricas

- (a) $1 + \operatorname{tg}^2 t = \sec^2 t$
 (b) $1 + \operatorname{cotg}^2 t = \operatorname{cossec}^2 t$
 (c) $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \sin b \cos a$
 (d) $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
 (e) $\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$
 (f) $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$
 (g) $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$
 (h) $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$

7. Utilize o que foi verificado no exercício anterior para mostrar que:

(a) $\sin \theta \sin \phi = \frac{1}{2}[\cos(\theta - \phi) - \cos(\theta + \phi)]$

(b) $\cos \theta \cos \phi = \frac{1}{2}[\cos(\theta - \phi) + \cos(\theta + \phi)]$

(c) $\sin \theta \cos \phi = \frac{1}{2}[\sin(\theta + \phi) + \sin(\theta - \phi)]$

(d) $\sin \theta + \sin \phi = 2 \sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)$

(e) $\sin \theta - \sin \phi = 2 \cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)$

(f) $\cos \theta + \cos \phi = 2 \cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)$

(g) $\cos \theta - \cos \phi = -2 \sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta-\phi}{2}\right)$

8. Mostre que $\sin 31^\circ + \sin 29^\circ = \sin 89^\circ$.

9. Resolva:

(a) $2 \cos^2 x + 3 = 5 \cos x$ (b) $\cos 7x = \cos 3x$

(c) $\sin 2x + \cos x = 0$ (d) $\sin 3x - 2 \sin 2x + \sin x = 0$

10. Sem utilizar calculadora, complete a seguinte tabela, marcando $\#$ quando a função não estiver definida.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{10\pi}{6}$
$\sin \theta$											
$\cos \theta$											
$\tan \theta$											
$\sec \theta$											
$\cot \theta$											
$\operatorname{cossec} \theta$											


11. Qual é a diferença entre $\sin x^2$, $\sin^2 x$ e $\sin(\sin x)$? Expresse cada uma das três funções em forma de composição.

12. Expresse as seguintes funções em termos de $\sin \theta$ e $\cos \theta$

(a) $\operatorname{tg} \theta$ (b) $\cos^2 \frac{\theta}{2}$ (c) $\sin^2 \frac{\theta}{2}$ (d) $\operatorname{cossec}^2 \frac{\theta}{2}$ (e) $\cot^2 \frac{\theta}{2}$

13. Se os ângulos de um triângulo medem x , $x + 1$ e $x + 2$ (em radianos), encontre x .

14. A seguir temos o triângulo ABC , onde $AB = BC = CA = 2$ e $AM = MC$.



Com base nele, encontre:

- (a) O comprimento BM (b) θ e β em radianos.
 (c) $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\sin \beta$, $\cos \beta$, $\operatorname{tg} \theta$ e $\operatorname{tg} \beta$.

15. Dado um triângulo ABC , se $\widehat{C} = \pi/2$ e $\widehat{A} = \widehat{B}$, encontre \widehat{A} em radianos e calcule $\cos \widehat{A}$, $\operatorname{sen} \widehat{A}$ e $\operatorname{tg} \widehat{A}$. (Dica: Aqui \widehat{A} representa o ângulo no vértice A , \widehat{B} o ângulo no vértice B , e \widehat{C} representa o ângulo no vértice C . Faça um desenho.)

16. Calcule os seguintes valores das funções em cada ângulo. (Dica: Use identidades trigonométricas.)

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| (a) $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})$ | (b) $\cos(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})$ | (c) $\cos(\frac{\pi}{2} + \pi)$ |
| (d) $\operatorname{sen}(3\pi) + \cos(3\pi)$ | (e) $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{12})$ | |

17. Em $t = 0$ dois carros se encontram na intersecção de duas estradas retas, com velocidades constantes \vec{v}_1 e \vec{v}_2 , que formam um ângulo θ .

(a) Qual é a distância entre os carros t horas depois deles passarem pelo cruzamento?

(b) Calcule a distância entre os carros 1 hora após passarem pelo cruzamento se:

- | | |
|--|--|
| (i) $v_1 = v_2$ e $\theta = \frac{\pi}{3}$ | (ii) $v_1 = v_2$ e $\theta = \frac{\pi}{4}$ |
| (iii) $v_1 = v_2$ e $\theta = 0$ | (iv) $v_1 = 2v_2$ e $\theta = \frac{\pi}{3}$ |

18. Dadas as funções f e g a seguir, obtenha $f \circ g$ e $g \circ f$ e seus respectivos domínios de definição:

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| (a) $f(x) = \sqrt{9 - 9x^2}$ | e | $g(x) = \operatorname{cotg} x$. |
| (b) $f(x) = \cos x$ | e | $g(x) = \sqrt{1 - 4x^2}$ |

19. Encontre funções f e g de modo que a função h possa ser escrita como $h = f \circ g$. Nem f nem g devem ser a função identidade.

- | | |
|--|---|
| (a) $h(x) = \operatorname{sen} 2x$ | (b) $h(x) = \operatorname{sen} x^2$ |
| (c) $h(x) = \operatorname{sen}^2 x$ | (d) $h(x) = \operatorname{sen}(\cos x)$ |
| (e) $h(x) = \operatorname{sen}^2 3x$ | (f) $h(x) = \operatorname{sen} x $ |
| (g) $h(x) = \cos x $ | (h) $h(x) = \tan(x^2 + 1)$ |
| (i) $h(x) = \sqrt{\operatorname{sen} x}$ | (j) $h(x) = 2^{\operatorname{cossec} x}$ |
| (k) $h(x) = 3 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x + 1$ | (l) $h(x) = \operatorname{sen}(\cos^2 x)$ |

20. Dizer como as funções $f(x) = x^2$, $g(x) = 4^x$ e $h(x) = \operatorname{tg} x$ devem ser compostas para que se obtenha a função $h(x) = 4^{\operatorname{tg} x^2}$.

21. Calcular o período das funções


- | | | |
|----------------------------|--|---|
| (a) $\operatorname{tg} 4x$ | (b) $\operatorname{sen}(x^2)$ | (c) $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{4}x)$. |
| (d) $\cos(\frac{2}{3}x^2)$ | (e) $\operatorname{cossec}(\frac{\pi}{7}\sqrt{x})$ | (f) $\operatorname{cotg}(7Bx)$ (onde $B > 0$). |

22. Esboce o gráfico das seguintes funções, identificando cuidadosamente as amplitudes e períodos. Não use calculadora gráfica ou computador.


- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| (a) $y = 3 \operatorname{sen} x$ | (b) $y = 3 \operatorname{sen} 2x$ | (c) $y = -3 \operatorname{sen} 2\theta$. |
| (d) $y = 4 \cos 2x$ | (e) $y = 4 \cos(\frac{1}{4}t)$ | (f) $y = 5 - \operatorname{sen} 2t$ |

23. Relacione as funções abaixo com os gráficos da figura, explicando os por quês.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| (a) $y = 2 \cos(t - \frac{\pi}{2})$ | (b) $y = 2 \cos t$ | (c) $y = 2 \cos(t + \frac{\pi}{2})$. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|




24. Nos itens a seguir, encontre uma possível fórmula para cada gráfico



- (a) Usando uma calculadora gráfica, ou um computador, encontre o período de $2 \sin 3t + 3 \cos t$.
- 25.** (b) Qual é o período de $\sin 3t$? E de $\cos t$?
 (c) Use a resposta da parte (b) para justificar sua resposta da parte (a).
- 26.** (a) Usando uma calculadora gráfica, ou um computador, encontre o período de $2 \sin 4x + 3 \cos 2x$. (b) Determine o período de $\sin 4x + \cos 2x$.
- 27.** Se m e n são dois números naturais, obtenha o período da função $\cos(mx) + \sin(nx)$.
- 28.** Defina e trace o gráfico das inversas das seguintes restrições principais de funções trigonométricas (não dê resultados aproximados):
 (a) $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ (b) $\cotg :]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$
 (c) $\sec : [0, \frac{\pi}{2} \cup \frac{\pi}{2}, \pi] \rightarrow [1, +\infty \cup -\infty, -1]$
 (d) $\operatorname{cossec} : [-\frac{\pi}{2}, 0 \cup 0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow]-\infty, 1] \cup]1, \infty[$
- 29.** Calcule:
 (a) $\arcsen \frac{1}{2}$ (b) $\arccos \frac{1}{2}$ (c) $\arctg 1$ (d) $\arctg \sqrt{3}$
 (e) $\arcsen \frac{1}{\sqrt{2}}$ (f) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$ (g) $\arctg 0$ (h) $\arcsen 1$
 (i) $\arcsen 0$ (j) $\arccos 1$ (k) $\arccos 0$ (l) $\arccotg(-1)$
 (m) $\arctg(-1)$ (n) $\arccotg \sqrt{3}$ (o) $\arcsen(-\frac{1}{2})$ (p) $\operatorname{arcsec} \sqrt{2}$
 (q) $\operatorname{arcossec}(-\frac{2\sqrt{3}}{3})$ (r) $\operatorname{arcsec}(-\frac{2\sqrt{3}}{3})$ (s) $\arccotg(-\frac{\sqrt{3}}{3})$ (t) $\operatorname{arcsec}(-1)$
 (u) $\operatorname{arcossec} 1$ (v) $\operatorname{arcsec} 2$ (w) $\operatorname{arcossec} 2$ (x) $\arcsen(-\frac{\sqrt{3}}{2})$
- 30.** Prove que $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ é estritamente crescente.
- 31.** Prove que $\operatorname{tg} x$ é estritamente crescente em $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- 32.** Para simplificar a expressão $\cos(\arcsen x)$, começamos colocando $\theta = \arcsen x$, com as restrições

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Como $\sin \theta = x$, pela definição de arcsen, podemos construir um triângulo retângulo e calcular o terceiro lado pelo Teorema de Pitágoras:



Observe que $\cos(\arcsen x)$ é $\cos \theta$. Desta forma, o desenho nos mostra que:

$$\cos(\arcsen x) = \sqrt{1 - x^2}$$

Usando uma idéia semelhante a essa, simplifique e calcule:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (a) $\cos(\arcsen x)$ | (b) $\sen(\arccos x)$ | (c) $\cos(\arctg x)$ |
| (d) $\cos(\text{arcsec } x)$ | (e) $\tg(\arccos x)$ | (f) $\sen(\arccos 1)$ |
| (g) $\cos(\arcsen \frac{1}{2})$ | (h) $\tg(\arccos 0)$ | |

33. Assumindo que $x > 0$, simplifique as funções abaixo eliminando as funções trigonométricas de suas expressões.

- | | | |
|--|--|--|
| (a) $f(x) = \tg(\text{arcsec } x)$. | (b) $g(x) = \sec(\arcsen x)$. | (c) $h(x) = \cos(\text{arcossec } x)$. |
| (d) $m(x) = \sen(\text{arcossec } x)$. | (e) $n(x) = \sen(\arctg x)$. | (f) $\phi(x) = \cos(\text{arcossec } x)$. |
| (g) $\theta(x) = \tg(\text{arccotg } x)$. | (h) $a(x) = \sec(\text{arccotg } x)$. | (i) $\lambda(x) = \sen(\text{arccotg } x)$. |

34. Assumindo que $x \in (0, 1)$, simplifique as funções abaixo eliminando as funções trigonométricas de suas expressões.

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (a) $f_0(x) = \sen(\arccos x)$. | (b) $f_1(x) = \cos(\arccos x)$. | (c) $f_2(x) = \cos(2 \arccos x)$. |
| (d) $f_3(x) = \cos(3 \arccos x)$. | (e) $f_4(x) = \cos(4 \arccos x)$. | |

Respostas:

- | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. (a) $\frac{\pi}{6}$ | (c) $\frac{\pi}{4}$ | (e) $\frac{17\pi}{18}$ | (g) $\frac{\pi}{12}$ | (i) 6π |
| (b) $\frac{\pi}{18}$ | (d) $\frac{3\pi}{4}$ | (f) $\frac{3\pi}{2}$ | (h) $\frac{70\pi}{18}$ | (j) $\frac{\pi}{5}$ |

2. (a) 3900° (b) 90° (c) 540° (d) 5° (e) 1800° (f) 270°

5. (a) $\sen 3\theta = 3 \sen \theta - 4 \sen^3 \theta$. (c) $\cos 4\theta = 8 \cos^4 \theta + 8 \cos^2 \theta + 1$.
 (b) $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$. (d) $\sen 4\theta = 4 \sen \theta \cos^3 \theta - 4 \sen^3 \theta \cos \theta$.

9. (a) $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
 (b) $x = k\pi/2$ ou $x = k\pi/5$, $k \in \mathbb{Z}$.
 (c) $x = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ou $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
 (d) $x = 2k\pi$ ou $x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

10.

11. se $f(x) = \sen x$ e $g(x) = x^2$, então $\sen x^2 = f(g(x))$, $\sen^2 x = g(f(x))$ e $\sen(\sen x) = f(f(x))$.

12.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{10\pi}{6}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{3}$
$\sec \theta$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	-2	$-\sqrt{2}$	-1	$-\sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	2
$\cot \theta$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{cosec} \theta$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\sqrt{2}$	-1	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(a) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

(b) $\frac{1 + \cos \theta}{2}$

(c) $\frac{1 - \cos \theta}{2}$

(d) $\frac{2}{1 - \cos \theta}$

(e) $\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}$

13. $x = \frac{\pi}{3} - 1.$

14. (a) $\sqrt{3}$

(b) $\theta = \frac{\pi}{3}$ e $\beta = \frac{\pi}{6}$

(c) $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \beta = \frac{1}{2}, \cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \operatorname{tg} \theta = \sqrt{3}, \operatorname{tg} \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$

15. $\hat{A} = \frac{\pi}{4}, \cos \hat{A} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \hat{A} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \operatorname{tg} \hat{A} = 1$

16. (a) $\frac{(1 + \sqrt{3})}{4}\sqrt{2}$

(b) $\frac{(1 - \sqrt{3})}{4}\sqrt{2}$

(d) -1

(c) 0

(e) $\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$

17. (a) $t\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos \theta}.$

(b) (i) $v_1.$

(ii) $\sqrt{2 - \sqrt{2}}v_1.$

(iii) 0.

(iv) $\sqrt{3}v_2.$

18. (a) $(f \circ g)(x) = 3\sqrt{1 - \cot^2 x}, \operatorname{Dom}(f \circ g) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{4} + n\pi, \frac{3}{4}\pi + n\pi \right];$

$(g \circ f)(x) = \cot(3\sqrt{1 - x^2}), \operatorname{Dom}(g \circ f) = (-1, 1)$

(b) $(f \circ g)(x) = \cos(\sqrt{1 - 4x^2}), \operatorname{Dom}(f \circ g) = \left[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \right];$

$(g \circ f)(x) = \sqrt{1 - 4\cos^2 x}, \operatorname{Dom}(g \circ f) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{3} + n\pi, \frac{2}{3}\pi + n\pi \right]$

19. (a) $f(x) = \sin x, g(x) = 2x$

(d) $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x$

(b) $f(x) = \sin x, g(x) = x^2$

(e) $f(x) = x^2, g(x) = \sin 3x$

(c) $f(x) = x^2, g(x) = \sin x$

(f) $f(x) = |x|, g(x) = \sin x$

(g) $f(x) = \cos x$, $g(x) = |x|$

(h) $f(x) = \operatorname{tg} x$, $g(x) = x^2 + 1$

(i) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \operatorname{sen} x$

(j) $f(x) = 2^x$, $g(x) = \operatorname{cossec} x$

(k) $f(x) = 3x^2 + x + 1$, $g(x) = \operatorname{sen} x$

(l) $f(x) = \operatorname{sen} x$, $g(x) = \cos^2 x$

20. $p = g \circ h \circ f$.

21. (a) $\frac{\pi}{4}$.

(b) Não é periódica.

(c) 4.

(d) Não é periódica.

(e) Não é periódica.

(f) $\frac{\pi}{7B}$.

22. (a) $P = 2\pi$, $A = 3$

(b) $P = \pi$, $A = 3$

(c) $P = \pi$, $A = 3$

(d) $P = \pi$, $A = 4$

(e) $P = 8\pi$, $A = 4$

(f) $P = \pi$, $A = 1$

23. (a) $h(t)$.

(b) $f(t)$.

(c) $g(t)$.

24. (a) $f(x) = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{x}{4} \right)$

(b) $f(x) = 2 + 2 \operatorname{sen} \left(\frac{x}{4} \right)$

(c) $f(x) = 5 \cos \left(\frac{x}{3} \right)$

(d) $f(x) = -4 \operatorname{sen}(2x)$

(e) $f(x) = -8 \cos \left(\frac{x}{10} \right)$

(f) $f(x) = 3 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi x}{9} \right)$

(g) $f(x) = 3 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi(x-1)}{9} \right)$

(h) $f(x) = 3 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi(x+2)}{9} \right)$

25. (a) O período é 2π .

(b) O período de $\operatorname{sen} 3t$ é $\frac{2\pi}{3}$ e de $\operatorname{cos} t$ é 2π .

(c) O período de $2 \operatorname{sen} 3t + 3 \operatorname{cos} t$ é 2π pois este é o menor número positivo múltiplo de $\frac{2\pi}{3}$ e 2π .

26. (a) O período é π .

(b) O período de $\operatorname{sen} 4x$ é $\frac{\pi}{2}$ e de $\operatorname{cos} 2x$ é π . Logo o período de $2 \operatorname{sen} 4x + 3 \operatorname{cos} 2x$ é o menor número positivo múltiplo de $\frac{\pi}{2}$ e π , que é π .

27. O período é $\frac{2M\pi}{mn}$, onde $M = \operatorname{mmc}(m, n)$.

29. (a) $\frac{\pi}{6}$.

(b) $\frac{\pi}{3}$.

(c) $\frac{\pi}{4}$.

(d) $\frac{\pi}{3}$.

(e) $\frac{\pi}{4}$.

(f) $\frac{\pi}{6}$.

(g) 0.

(h) $\frac{\pi}{2}$.

(i) 0.

(j) 0.

(k) $\frac{\pi}{2}$.

(l) $-\frac{\pi}{4}$.

(m) $-\frac{\pi}{4}$.

(n) $\frac{\pi}{6}$.

(o) $-\frac{\pi}{6}$.

(p) $\frac{\pi}{4}$.

(q) $-\frac{\pi}{3}$.

(r) $\frac{5\pi}{6}$.

(s) $-\frac{\pi}{3}$.

(t) π .

(u) $\frac{\pi}{2}$.

(v) $\frac{\pi}{3}$.

(w) $\frac{\pi}{6}$.

(x) $-\frac{\pi}{3}$.

30. Se temos $\theta, \phi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ com $\theta > \phi$, então $\theta + \phi \in]-\pi, \pi[$ e $\theta - \phi \in]0, \pi]$. Assim, como $\operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen} \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right)$, $\cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) > 0$ e $\operatorname{sen} \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right) > 0$, temos que $\operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen} \phi > 0$, ou seja, $\operatorname{sen} \theta > \operatorname{sen} \phi$. Portanto a função é estritamente crescente.

31. Se temos $\theta, \phi \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ com $\theta > \phi$, então $\theta - \phi \in]0, \pi[$. Além disso, temos que:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \theta - \operatorname{tg} \phi &= (1 + \operatorname{tg} \theta \operatorname{tg} \phi) \operatorname{tg} (\theta - \phi) \\&= \left(1 + \frac{\operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi}{\cos \theta \cos \phi}\right) \frac{\operatorname{sen} (\theta - \phi)}{\cos (\theta - \phi)} \\&= \left(1 + \frac{\cos (\theta - \phi) - \cos \theta \cos \phi}{\cos \theta \cos \phi}\right) \frac{\operatorname{sen} (\theta - \phi)}{\cos (\theta - \phi)} \\&= \frac{\cos (\theta - \phi) \operatorname{sen} (\theta - \phi)}{\cos \theta \cos \phi \cos (\theta - \phi)} \\&= \frac{\operatorname{sen} (\theta - \phi)}{\cos \theta \cos \phi}\end{aligned}$$

com $\operatorname{sen} (\theta - \phi) > 0$, $\cos \theta > 0$ e $\cos \phi > 0$. Logo $\operatorname{tg} \theta - \operatorname{tg} \phi > 0$ e a função é estritamente crescente.

32. (a) $\cos(\operatorname{arcsen} x) = \sqrt{1 - x^2}$

(b) $\operatorname{sen}(\operatorname{arccos} x) = \sqrt{1 - x^2}$

(c) $\cos(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(d) $\cos(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{x}$

(e) $\operatorname{tg}(\operatorname{arccos} x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$

(f) $\operatorname{sen}(\operatorname{arccos} 1) = 0$

(g) $\cos\left(\operatorname{arcsen} \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(h) $\operatorname{tg}(\operatorname{arccos} 0) = \infty$

33. (a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$.

(d) $m(x) = \frac{1}{x}$.

(g) $\theta(x) = \frac{1}{x}$.

(b) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

(e) $n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

(h) $a(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

(c) $h(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$.

(f) $\phi(x) = x$.

(i) $\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

34. (a) $f_0(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

(d) $f_3(x) = 4x^3 - 3x$.

(b) $f_1(x) = x$.

(c) $f_2(x) = 2x^2 - 1$.

(e) $f_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$.